せいめい望遠鏡初期観測成果: M型星AD Leoの恒星フレアの 連続測光・分光観測

Okayama Observatory, Kyoto University

SEIMEI
TELESCOPE

行方宏介
(京都大学D2)

[共同研究者]

前原裕之(NAOJ)、河合広樹、佐々木亮、岩切渉、坪井陽子(中央大学)、
野津湧太、A. Kowalski(University of Colorado)、本田敏志(兵庫県立大)、
岡本壮師、野上大作、柴田一成(京大)、OISTER team collaborations

太陽フレア

- 様々な波長での突発的増光現象
- 黒点の磁気エネルギーを磁気リコネクションを介して解放
- 継続時間：数分～数時間
- 磁気嵐・放射線の照射という形で、地球環境に大きな影響を与える

可視光全面像

光球：可視光(G-band)

黒点=磁束管の断面

コロナ：軟X線

太陽フレア

- 様々な波長での突発的増光現象

太陽フレアの多波長観測(Kane+74)

恒星フレア

- **恒星フレア**：様々な波長で観測あり
- 特徴：
 - ライトカーブは似ている
 - エネルギーが、最大級の太陽フレアの10-1万倍大きい場合も
 - 継続時間 = 数分 ~ 数日
- 極端現象としての興味・系外惑星に与える影響という観点で、注目 (Maehara+12, Notsu+19, Yamashiki+19, 他多数)

恒星フレア研究の現状・問題点

- 恒星フレアは、多波長(~多温度)・短時間現象
- 多波長同時+数分以下の時間分解能のモニタ観測が必須!
→ **難しく、数・質共に不十分**

- わかっている点：
 - リコネクションモデル
(Shibata & Yokoyama+99, Namekata+17)
 - 定性的類似性

- 特にわかっていない点：
 - **エネルギー分配の定量的評価**
 - **エネルギー輸送・放射機構**
 - **質量放出の有無**
 - Etc.

せいめい望遠鏡でのフレア観測計画

- 2019年2月、**京都大学岡山せいめい望遠鏡**がついに観測開始
 - 主鏡：口径3.8mの分割鏡(東アジア最大)
 - 装置：KOOLS-IFU(可視光低分散面分光器)

→ 大口径・潤沢な観測時間で、
高時間分解能(30-60s)で連続分光が可能に

京都大学岡山3.8mせいめい望遠鏡

装置：KOOLS-IFU

- 波長分解能 ~ 2000 (最大)
- 4000-10000Å程度までカバー

本研究の背景・目的

背景：近年M型星周りの惑星探査が盛ん

→ M型星フレアが世界的に注目

目的：

- せいめい望遠鏡/KOOLS-IFU(H α 分光)を中心に大学間連携でM型星の多波長同時観測を行い、フレアを検出する

Q. M型星フレア時の彩層放射の基本的性質が、
太陽フレアの知見を用いてどのような説明できるのか？

e.g.放射機構、彩層への
エネルギー注入、質量放出の有無

観測の概要

- 観測天体：AD Leo (dMe3.5, 温度 $\sim$ 3500K, Vmag=9.5)
- 近傍の活動的なフレア星として有名 (e.g. Hawley+97)。
- 2019年3-4月の8.5夜で、せいめい望遠鏡+大学間連携で観測
→ **多波長同時観測を実現**

岡山

- せいめい望遠鏡/KOOLS-IFU
- MITSuME測光(大学間連携; PI 前原)

西はりま(大学間連携)
なゆた/MALLS中分散(H α)

中央大学SCAT低分散
Balmer線分光モ二夕観測

観測の概要

- 8.5夜で観測で12個のフレアを検出に成功
- この発表で注目する現象3つ
 - 1) **フレアA** : 10^{33} erg級のスーパーフレア
 - 2) **フレアB** : 全観測装置で観測があるフレア
 - 3) **星の自転に伴った変動**

全体のライトカーブ

1) フレアAの特徴：ライン幅の時間変化

- 10^{33} erg級の巨大フレア
(~最大級の太陽フレアの10倍)

H α = 3×10^{31} erg

$\ll$ g-band = 1×10^{33} erg

特徴

- 連続光増光 + 輝線幅増大(14 Å)
→ フレア後期: なし + 輝線幅減少
→ **今まで報告例のない現象**

1) 太陽との比較・解釈

太陽フレアの場合

- H α 線の幅も増大($\sim 10\text{\AA}$)
(例: Ichimoto & Kurokawa 84 $\rightarrow$ 右図)

H α 線幅の解釈

- Stark効果
($\propto n_e^{2/3}$; n_e =電子密度)
- Opacity broadening

考察

- 少なくとも、Hardなスペクトルのエネルギー注入が行われたことが示唆される

↓ 太陽フレアのH α 観測例

↓ 1次元フレア大気数値計算の結果

Input エネルギー増

$\rightarrow$ 電子密度増 $\rightarrow$ ライン幅増

2) フレアBの特徴：可視光の増光が非常に弱い

- 観測：複数のBalmer線, 可視連続光, X線で同時観測
 $\sim 10^{30}$ erg $\sim 3 \times 10^{31}$ erg

特徴

- 連続光の増光が非常に弱い

連続光/H α 強度

フレアB: < 0.014 以下

フレアA: ~ 0.25

- 連続光の増光が弱いフレアは、特に最近報告されつつある(この後の前原さんの話等)

→ 原因は何か？

フレアBの多波長観測の結果

2) なぜ可視連続光の増光がないのか？

- 太陽フレアでも同様の現象の観測 (Watanabe+18)

- 数値計算：**H α と連続光は非線形** (1次元計算; Namekata in prep.)

→ 可視光がない原因の可能性
 例) H α が1/10 → 連続光1/100

フレアBまとめ

- 波長ごとのエネルギー分配：
 フレアの規模(注入エネルギー)に依存する可能性を観測・理論両面で示した。

3) 自転による変動

- X線、H α 線、(+連続光)で同時に自転変動(自転周期 $\sim$ 2.2日)
→ 恒星観測では稀な、長期モニタの成果

わかったこと

- コロナ放射(X線)の振幅は、光球・彩層放射より大きい
→ filling factor、あるいはcontrastが違う可能性
- 光球と彩層・コロナの位相に大きな違いなし? (< 0.25 自転)
→ 太陽では逆相関: 太陽の活動領域の空間分布と描像が異なる?

光球(黒点+
プラージュ)
振幅 $< \sim 3$

彩層
振幅 $\sim 20\%$

コロナ
振幅 $\sim 50\%$

想像図

本発表のまとめ

- **せいめい望遠鏡の観測が開始!**

→ 世界最高級の時間分解能でモニタ観測を実現し成果が出始める
今回の観測でわかったこと

- フレアA：ライン幅の変化

→ エネルギー注入量の変化を示唆

- フレアB：optical/X線の多波長で同時観測

→ フレア毎に、波長毎のエネルギー分配が異なる可能性

- X線・H α (・可視連続光)に同位相の自転変動が見られること。

課題：均一なフレア観測数の増加・高精度な可視連続光の測光観測等

→ **TESS+せいめい/大学間連携の同時観測**(→この後前原さん)